

Albertino

Dinkel

Züchter/Züchtervertrieb:
Saatzucht Dr. Alter

Charakteristika der Sorte

Sortentyp:
Einzelährentyp

Ackerbauliche Eigenschaften:
Die Sorte ist winterhart und für den breiten Anbau geeignet. Sie besitzt eine frühe und gleichmäßige Abreife und eine überragende Qualität.

Produktionstechnik

Intensivanbau

Aussaat:
Ortsüblicher Aussaatzeitpunkt.

Saatstärken:
früh: 150 bis 160 kg/ha
300 bis 330 Körner/m²
mittel bis spät: 160 bis 180 kg/ha
340 bis 360 Körner/m²

Unkrautbekämpfung:
Ohne Einschränkung, mit allen im Dinkel zugelassenen Mitteln.

Wachstumsregulator:
Einsatz je nach Standort.
EC 25 - 29: 0,8 l/ha Manipulator/Gexxo
EC 30 - 32: 0,3 l/ha Manipulator/Gexxo
+0,3 l/ha Moddus

Fungizideinsatz:
EC 30 - 32: breit wirksames Fungizid
EC 49 - 51: Abschlussbehandlung

Düngung:
P,K und Mg-Dünung: nach Bodenuntersuchung auf Gehaltsklasse C orientieren, Weichweizen gilt als Basisorientierung
Schwefelversorgung sicherstellen

N-Düngung (ertrags- und qualitätsbetont):
1. Gabe: Vegetationsbeginn (EC 13 - 21)
50 - 60 kg N/ha

2. Gabe: zu Schoßbeginn (EC 30 - 32)
30 - 50 kg N/ha

3. Gabe: Spätdüngung (EC 39 - 51)
50 - 60 kg N/ha

Sortenbeschreibung nach Kriterien des BSA


Wachstum:



Ährenschieben:



Reife:



Pflanzenlänge:



Neigung zu:

Auswinterung:



Lager:



Anfälligkeit für:

Mehltau:



Blattseptoria:



Braunrost:



Gelbrost:



Ertragseigenschaften:

Bestandesdichte:



Kernzahl/Ähre:



Tausendkornmasse:



Vesenertrag Stufe 1:



Vesenertrag Stufe 2:



Die Sortenbeschreibungen sind auf der Basis sorgfältig recherchiertener Ergebnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem hängt der Erfolg der Kultur auch von unsererseits nicht beeinflussbaren Faktoren ab, die nichts mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Sorten zu tun haben. Eine Gewähr oder Haftung für das Gelingen der Kultur können wir deshalb nicht übernehmen.



Saatgut 2000